

Popravek

Marjeta Blinc-Pesek, dr. med.

/MF. Kopal. Ponovno o olanzapinu in drugih premikih v psihofarmakoterapiji. Diskusijski prispevki. Viceversa 1999; 26 : 23)

Profesor P. V. Tran je v svojem predavanju na Lilly-jevem vikendu v Zrečah dne 26. marca 1999 omenil prospektivno študijo vloge olanzapina na potek shizofrenije, če apliciramo zdravilo v prodromalni fazi bolezni. Znano je namreč, da je potek bolezni blažji, če je zdravljenje pravočasno. Ob tem se mi je pojavilo vprašanje, kako so raziskovalci definirali prodromalno fazo bolezni. Torej je bilo moje vprašanje prof. Pierru Tranu, kakšna je bila definicija prodromalne faze in ne, ali je smiselno aplicirati zdravilo v prodromalni fazi, saj odgovor pričakujemo ravno iz te študije, seveda čez nekaj let. Odgovoril je, da je imela raziskovalna skupina prav s tem vprašanjem največ dela. Končno pa so prodromalno fazo shizofrenije, torej začetek bolezni, definirali s prisotnostjo nespecifičnih znakov, kot so motnje koncentracije, anksioznost, depresivnost, glavoboli in podobni telesni znaki in hkrati z vsaj eno bizarnostjo v vedenju ali mišljenju.