

ZA SPECIALISTA IN SPLOŠNEGA ZDRAVNIKA

Aurorix - najpogostejša vprašanja in odgovori

Kakšna je najprimernejša shema za odmerjanje Aurorixa?

Standardni odmerek Aurorixa je 450 mg – 2 tableti zjutraj in 1 popoldne. Aurorix ima ugoden vpliv na psihofizične sposobnosti, deluje vzpodbujajoče in je brez sedativnega učinka, kar je ugodno predvsem za začetek dneva.

Ali lahko Aurorix kljub kratkemu razpolovnemu času predpisujemo po dozirni shemi b.i.d. (2x dnevno)?

Razpolovni čas moklobemida (Aurorix) je 1–2 uri, kar se nanaša na plazemske koncentracije učinkovine, encim MAO-A v centralnem živčevju, ki ga moklobemid reverzibilno inhibira, pa ostane inhibiran 12 do 16 ur. Inhibicija encima MAO-A je bistvena za klinični učinek zdravila, zato lahko Aurorix odmerjamo 2x dnevno.

Ali je potrebno odmerek Aurorixa titrirati?

Zdravljenje lahko začnemo s standardnim odmerkom 450 mg. Če po nekaj tednih ni odgovora, lahko odmerek povišamo na 600 mg, oziroma v posameznih primerih znižamo.

V kolikšnem času lahko pričakujemo prvi terapevtski učinek Aurorixa?

Pri nekaterih bolnikih opazimo izboljšanje že po 10–14 dneh, velikokrat pa je potrebno na učinek zdravila počakati nekaj tednov.

Če po 4 tednih terapije ni zelenega učinka, odmerek zdravila zvišamo.

Katere so prednosti Aurorixa pri dolgotrajni terapiji?

Aurorix je učinkovit in bolniki ga dobro prenašajo, kar je pri dolgotrajni terapiji bistvenega pomena.

Ali je Aurorix priporočljiv za aktivnega bolnika?

Aurorix je edini antidepresiv za katerega je dokazano, da tudi v uvajalnem obdobju nima vpliva na reakcijski čas, zato je posebej primeren za aktivnega bolnika (šoferji...).

Ali Aurorix vpliva na seksualno aktivnost bolnika?

Študije so pokazale, da Aurorix nima nobenega vpliva na seksualne funkcije (libido, erekcija, ejakulacija). Kadar je seksualna disfunkcija posledica depresije, se ob zdravljenju z Aurorixom znatno izboljša.

Kako razložimo vpliv Aurorixa na spanje in kako se izogniti nespečnosti?

Študije so pokazale, da Aurorix izboljša kvaliteto spanja, vendar imajo nekateri bolniki težave z uspavanjem (zvečer težko zaspijo). V teh primerih bolnika opozorimo, da popoldanski odmerek Aurorixa vzamejo čim bolj zgodaj.

Ali lahko Aurorix varno uporabljamo pri bolnikih s kardiovaskularnimi obolenji?

Aurorix ni kardiotoksičen in nima klinično pomembnih interakcij z zdravili, ki se običajno uporabljajo pri kardiovaskularnih obolenjih (ACE inhibitorji, *b* blokatorji, Ca antagonisti, digitalis...), zato ga lahko varno uporabljamo.

Ali je potrebno pri posebnih skupinah bolnikov odmerke Aurorixa posebej prilagajati?

- *starostniki*: odmerka NI potrebno prilagajati
- *bolniki z motnjami v delovanju ledvic*: odmerka NI potrebno prilagajati
- *bolniki z motnjami v delovanju jeter*: odmerek znižamo na 1/2 do 1/3 standardnega odmerka, odvisno od prizadetosti jeter

Ali lahko Aurorix kombiniramo z drugimi psihotropnimi zdravili?

Aurorix lahko varno kombiniramo z benzodiazepini, nevroleptiki, antiepileptiki (previdnost je potrebna pri terapiji z karbamazepinom).

Ali Aurorix potencira delovanje alkohola?

Dokazano je, da Aurorix nima klinično pomembnih interakcij z alkoholom oz. ne potencira njegovega delovanja (ni sprememb v orientaciji, sposobnosti koncentracije, reakcijskem času, psihomotoričnih sposobnostih). Vse študije se nanašajo na zmerno pitje (koncentracije alkohola v krvi do 0,5 promila).

S katerimi zdravili Aurorixa ne smemo kombinirati?

Aurorixa ne dajemo sočasno z selegelinom, klomipraminom, petidinom, dekstrametorfanom.

Katere so prednosti Aurorixa pred antidepresivi tipa S.S.R.I?

Aurorix se od antidepresivov tipa S.S.R.I. razlikuje v:

- hitrejšem nastopu delovanja,
- ugodnejšem profilu stranskih učinkov,
- možnosti prilagajanja odmerkov,
- kratkem razpolovnem času (se hitro izloča iz organizma, zato ne potrebuje izpiralnega obdobja),
- boljšem profilu interakcij z drugimi zdravili.

Kdaj se odločimo za zamenjavo antidepresiva?

Če po 4 tednih terapije ne opazimo izboljšanja, odmerek antidepresiva zvišamo. Če bolnik zdravilo dobro prenaša, lahko odmerek po potrebi postopoma zvišujemo, dokler ne dosežemo želenega odgovora oziroma maksimalnega dovoljenega odmerka.

Kako dolgo naj traja terapija z Aurorixom?


Večina strokovnjakov se strinja, da je za uspešno ozdravitev bolezni potrebna vsaj 6 mesečna terapija z antidepresivi, pogosto, zlasti pri starejših bolnikih, pa zdravljenje traja leto ali več.

moklobemid

AURORIX®

POVRNE NASMEH

RIMA ANTIDEPRESIV



- zelo malo stranskih učinkov
- zanestljivo ne vpliva na reakcijske sposobnosti
- brez omejitev pri starejših
- kompatibilnost z drugimi zdravili in alkoholom
- varen pri prekomernem odmerjanju

Sestava:	Moklobemid.
Indikacije:	Zdravljenje depresivnih sindromov in socialne fobije.
Odmerjanje:	Priloga: Priporočeni odmerek je 300-600 mg dnevno. Bolnikom s hudim odpovedovanjem jetrne presnove dajemo polovico ali tretjino običajnega dnevnega odmerka.
Kontraindikacije:	Znana preobčutljivost za zdravilo. Akutna konfuzna stanja. Uporaba v pediatriji, ker pri otrocih z zdravilom ni kliničnih izkušenj. Sočasna uporaba moklobemida in selegilina.
Previdnost:	Če sta prevladujoči značilnosti depresije razburjenost in vznemirjenost, Aurorixa ne dajemo ali pa ga dajemo v kombinaciji s sedativom (npr. benzodiazepinom). Bolnike s samomorilnimi nagnjenji moramo skrbno nadzorovati. Previdnost je potrebna pri bolnikih s shizofreničnimi simptomi ali shizoafektivnimi motnjami; s tireotoksikozo ali feokromocitomom. Vsem bolnikom z zvišanim krvnim tlakom svetujemo, naj ne jedo v večjih količinah hrane z visoko vsebnostjo tiramina. Izogibati se moramo kombinaciji moklobemida in klomipramina ali deksmetorofana. Pri nosečnicah in doječih materah moramo presoditi o koristnosti zdravljenja za mater glede na možno tveganje za plod oz. otroka.
Interakcije:	Pri živalih moklobemid poveča učinke opiatov. Kombiniranega zdravljenja s petidinom ne priporočamo. Cimetidin podaljša presnavljanje moklobemida.
Predoziranje:	Kot pri drugih antidepresivih je lahko mešano predoziranje z moklobemidom tudi življenjsko nevarno.
Oprema:	30 tablet (z zarezo) po 150 mg. Popolna navodila so na voljo pri zastopniku.

Proizvajala:
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Basel, Švica



Zastopa:
Hoffmann-La Roche Ltd
Podružnica Ljubljana
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana